

# 【泌尿器がん】

更新:2022.10.26

プロトコール	薬剤	投与量	投与日	期間	がん腫
オブジーボ	オブジーボ	240 mg/body	day 1	14 日毎	腎細胞がん
オブジーボ+ヤーボイ	オブジーボ	240 mg/body	day 1	21 日毎	腎細胞がん
	ヤーボイ	1 mg/kg	day 1		
	4コースまで、以降はオブジーボ単独(14日間隔)				
オブジーボ+カボメティクス	オブジーボ	240 mg/body	day 1	14 日毎	腎細胞がん
	カボメティクス	40 mg/日	連日(1日1回)		
トーリセル	トーリセル	25 mg/body	day 1	7 日毎	腎細胞がん
キイトルーダ+レンビマ	キイトルーダ	200 mg/body	day 1	21 日毎	腎細胞がん
	レンビマ	20 mg/日	連日(1日1回)		
キイトルーダ+インライタ	キイトルーダ	200 mg/body	day 1	21 日毎	腎細胞がん
	インライタ	5 mg/回	連日(1日2回)		
バベンチオ+インライタ	バベンチオ	10mg/kg	day 1	14 日毎	腎細胞がん
	インライタ	5 mg/回	連日(1日2回)		
GEM+CDDP	ジェムザール	1000 mg/m <sup>2</sup>	day 1, 8, 15	28 日毎	尿路上皮がん
	シスプラチン	70 mg/m <sup>2</sup>	day 1		
GEM+CBDCA	ジェムザール	800 mg/m <sup>2</sup>	day 1, 8, 15	28 日毎	尿路上皮がん
	カルボプラチン	AUC4	day 1		
キイトルーダ	キイトルーダ	200 mg/body	day 1	21 日毎	尿路上皮がん
バベンチオ	バベンチオ	10 mg/kg	day 1	14 日毎	尿路上皮がん
パドセブ	パドセブ	1.25 mg/kg	day 1, 8, 15	28 日毎	尿路上皮がん
DOC	ドセタキセル	75 mg/m <sup>2</sup>	day 1	21 日毎	前立腺がん
CBZ	ジェブタナ	25 mg/m <sup>2</sup>	day 1	21 日毎	前立腺がん
BEP	ブレオ	30 mg/body	day 2, 9, 16	21 日毎	精巣腫瘍
	エトポシド	100 mg/m <sup>2</sup>	day 1-5		
	シスプラチン	20 mg/m <sup>2</sup>	day 1-5		