

# 【尿路上皮がん】

更新:2025.12.31

プロトコール	薬剤	投与量	投与日	期間
GEM+CDDP	ゲムシタビン	1000 mg/m <sup>2</sup>	day 1, 8, 15	28 日毎
	シスプラチン	70 mg/m <sup>2</sup>	day 1	
GEM+CBDCA	ゲムシタビン	800 mg/m <sup>2</sup>	day 1, 8, 15	28 日毎
	カルボプラチン	AUC4	day 1	
オプジーボ+GEM+CDDP	ニボルマブ	360 mg/body	day 1	21 日毎
	ゲムシタビン	1000 mg/m <sup>2</sup>	day 1, 8	
	シスプラチン	70 mg/m <sup>2</sup>	day 1	
オプジーボ+GEM+CBDCA	ニボルマブ	360 mg/body	day 1	21 日毎
	ゲムシタビン	1000 mg/m <sup>2</sup>	day 1, 8, 15	
	カルボプラチン	AUC4	day 1	
キイトルーダ+パドセブ	ペムブロリズマブ	200 mg/body	day 1	21 日毎
	エンホルツマブ ベドチン	1.25 mg/kg	day 1, 8	
イミフィンジ+GEM+CDDP	デュルバルマブ	1500 mg/body (体重30kg以下の 場合は20mg/kg)	day1	21 日毎
	ゲムシタビン	1000 mg/m <sup>2</sup>	day 1, 8	
	シスプラチン	70 mg/m <sup>2</sup> (腎機能不良例は 35 mg/m <sup>2</sup> )	day 1 (腎機能不良例 はday1,8)	
イミフィンジ	デュルバルマブ	1500 mg/body (体重30kg以下の 場合は20mg/kg)	day1	28日毎
キイトルーダ	ペムブロリズマブ	200 mg/body	day 1	21 日毎
	ペムブロリズマブ	400 mg/body	day 1	42 日毎
バベンチオ	アベルマブ	10 mg/kg	day 1	14 日毎
パドセブ	エンホルツマブ ベドチン	1.25 mg/kg	day 1, 8, 15	28 日毎