【胆道・胆管がん】

更新:2025.12.31

プロトコール	薬剤(一般名)	投与量	投与日	期間
GEM	ゲムシタビン	1000 mg/㎡	day 1, 8, 15	28 日毎
GEM+S1	ゲムシタビン テガフール/ギメラシル/オテラシル	1000 mg/㎡ 60 mg/㎡	day 1, 8 day 1-14 内服	21 日毎
GEM+CDDP	ゲムシタビン シスプラチン	1000 mg/㎡ 25 mg/㎡	day 1, 8 day 1, 8	21 日毎
GEM+CDDP+S1	ゲムシタビン シスプラチン テガフール/ギメラシル/オテラシル	1000 mg/㎡ 25 mg/㎡ 80 mg/㎡	day 1 day 1 day 1-7 内服	14 日毎
イミフィンジ+GC	デュルバルマブ ゲムシタビン シスプラチン	1500mg/body 20mg/kg(30kg以下) 1000 mg/㎡ 25 mg/㎡	day 1 day 1, 8 day 1, 8	21 日毎
イミフィンジ	デュルバルマブ	1500mg/body 20mg/kg(30kg以下)	day1	28 日毎
キイトルーダ+GC	ペムブロリズマブ ゲムシタビン シスプラチン	200mg/body 1000 mg/㎡ 25 mg/㎡	day 1 day 1, 8 day 1, 8	21 日毎